

## Если вам назначены капельницы



Продолжительность капельницы, как правило, составляет не менее часа, поэтому перед установкой капельницы сходите в туалет, если это необходимо.

Во время капельницы нельзя вставать, постарайтесь поменьше двигать рукой, в которую проходит инфузия.



Если у вас появились любые неприятные ощущения, вы почувствовали слабость, жжение или другие непривычные для вас симптомы – **немедленно вызовите медсестру и сообщите ей об этом.**

Если вам нужно срочно встать, воспользуйтесь кнопкой вызова и пригласите медсестру, чтобы она безопасно сняла капельницу.

После капельницы полежите несколько минут, избегайте резкого вставания.

Если Вам установлена инфузионная помпа, с помощью которой осуществляется дозированное внутривенное введение в организм лекарственных препаратов в соответствии с заданной программой, Вам необходимо соблюдать следующие предосторожности:

- Не допускайте частого перегиба пластикового катетера (если он установлен в периферическую вену), чтобы избежать развитие флебита.
- Самостоятельно не меняйте повязку, чтобы избежать инфицирования.
- Аккуратно обращайтесь с инфузوماتом: не допускайте ударов, механических повреждений, нагревания, не меняйте настройки инфузомата.
- По окончании инфузии обратитесь к медицинской сестре, имеющей опыт работы с данными системами, для удаления периферического катетера либо иглы из инфузионного порта.



Современные помпы при своей работе могут давать погрешность по времени 10% от заданного, поэтому ваша помпа может закончиться несколько быстрее или медленнее среднего времени.

Это является допустимым отклонением и не влияет на качество лечения.