

Все лучшее
в медицине!



Since 1990



Система
менеджмента
качества
ISO 9001:2008



Памятка

Памятка перед наркозом

**После анестезии в течение 12 часов
нельзя:**

- выполнять работы, связанные с необходимостью повышенной концентрации и внимания
- управлять транспортным средством
- принимать алкоголь

Эти виды активности требуют полного восстановления психомоторных функций, что иногда занимает 24-72 ч после операции.

Для предотвращения осложнений во время анестезии вам нужно соблюдать следующие условия:

- не принимать пищу в течение 6 часов до анестезии
- не пить любые напитки, включая воду, за 4 часа до анестезии
- в течение суток до проведения анестезии не принимать алкоголь

Если вы нарушили какое-либо из этих условий, анестезиолог вправе отказать в проведении анестезиологического пособия.

Обследование перед наркозом:

Общий анализ крови, включая тромбоциты, ЭКГ (действительны в течение 14 дней), анализ крови на ВИЧ, RW, HbsAg, HCVAg (действительны в течение месяца).

(495) 995-00-33

www.medicina.ru

Лицензия № ЛО-77-01-007145

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Обязательно сообщите анестезиологу, если:

- вы страдаете сахарным диабетом
- у вас повышенное давление
- вы страдаете ишемической болезнью сердца или переносили инфаркт миокарда
- у вас есть хронические заболевания органов дыхания (например, бронхиальная астма)
- в ближайшее время (две недели) переносили ОРВИ или грипп
- вы постоянно принимаете любые лекарственные препараты (желательно заранее подготовить список этих препаратов)
- вам уже делали анестезию, и после нее возникли осложнения.

К причинам, исключающим возможность проведения анестезии в амбулаторных условиях, можно отнести: нестабильность соматического состояния (декомпенсация хронических заболеваний), острые воспалительные или инфекционные заболевания, не связанные с предстоящим вмешательством, патологическое ожирение, наличие наркотической зависимости, отсутствие голодной паузы.

После наркоза вам обязательно нужно будет соблюдать рекомендации анестезиолога. Желательно, чтобы кто-то из родственников сопровождал пациента из поликлиники домой. Особенно это важно для пожилых пациентов.

Также нужно иметь в виду, что в случае непредвиденных реакций на обезболивание, которые случаются крайне редко, некоторым пациентам может потребоваться госпитализация для наблюдения в послеоперационном периоде.

Клиника «Медицина»



125047, Москва

2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10

+7 (495) 995-00-33, www.medicina.ru